Zoletil 舒泰注射用麻醉剂说明书
法国维克宠物保健公司Virbac

详细介绍 ：

导读：

Zoletil舒泰是一种全新的注射用麻醉剂，含有分离型麻醉剂成分替来他明(Tiletamine)，和兼有镇定剂和肌

[成分]

每只冻干瓶含有：

Zoletil 20

替来他明(Tiletamine，盐酸盐)……50mg

唑拉西泮(Zolazepam，盐酸盐)……50mg

赋形剂

Zoletil 50

替来他明(Titetamme，盐酸盐)……125mg

唑拉西泮(Zolazepam，盐酸盐)……125mg

赋形剂

Zoletil 100

替来他明(Tiletamine，盐酸盐)……250mg

唑拉西泮(Zolazepam，盐酸盐)……250mg

赋形剂

每只稀释瓶含有5ml灭菌稀释液，用于稀释冻干瓶内的麻醉剂。

[简介]

Zoletil舒泰是一种全新的注射用麻醉剂，含有分离型麻醉剂成分替来他明(Tiletamine)，和兼有镇定剂和肌
的作用的唑拉西泮(Zolazepam)。

▼Zoletil-50
Zoletil-50 Image not found or type unknown 资源描述： Zoletil舒泰是一种全新的注射用麻醉剂，含有分离型麻醉剂成分替来他明(Tiletamine)，和兼有镇定剂和肌肉松弛的作用 文件来源：网络

Zoletil舒泰具有诱导期短、副反应小、最安全
等特点。不管是通过肌肉注射，还是通过静脉注射，Zoletil舒泰都具有良好的耐药性。Zoletil舒泰具有非

[适用范围]

用于犬、猫、及野生动物的封闭麻醉和全身麻醉。

[剂量]

手术前用药

硫酸阿托犬：0．1mg／kg皮下注射：

猫：0．05mg／kg皮下注射。

15分钟后注射Zoletil舒泰。

诱导剂量

犬：7—25mg／kg体重，肌肉注射。或5—10mg/kg体重,静脉注射。

猫：10—15mg/kg体重，肌肉注射。或5—7.5mg/kg体重，静脉注射。

麻醉持续时间：根据以上剂量，持续20—30分钟（舒泰100持续30—60分钟）。

补充注射

第1次剂量的1／2—1／3，最好是静脉注射。

野生动物

维克公司提供的小册子《ZOLETIL—野生动物的麻醉剂》(ZOLETIL，anaesthetic of the wild fauna)内有更详细的内容。

动物种类	给药途径	参考剂量
灵长类(平均)	肌肉注射	4-6mg／kg
猫科动物(平均)	肌肉注射	4-7.5mg／kg
犬科动物(平均)	肌肉注射	5-11mg／kg
熊科动物(平均)	肌肉注射	3.5-8mg／kg
牛科动物(平均)	肌肉注射	3.5-33mg／kg
灵猫科动物(平均)	肌肉注射	2.5-6mg／kg
鼠科动物(平均)	肌肉注射	50-75mg／kg
兔(平均)	肌肉注射	50-75mg／kg
豚鼠(平均)	肌肉注射	20mg／kg
仓鼠（平均)	肌肉注射	50mg／kg

[使用方法]

用全部的稀释液将冻干的活性成分溶解，获得需要的浓度(Zoletil舒泰20：20mg／ml；Zoletil舒泰50：50m
对于野生动物，如果使用标枪注射器，使用的浓度可以提高，可以减少稀释液的用量，使麻醉剂浓度达到40

[禁忌症]

动物用全身有机磷或氨基甲酸盐治疗时。

严重的心脏或呼吸机能障碍。

胰腺功能不全。

严重高血压。

[注意事项]

仅供动物使用。

推荐在实施麻醉前禁食12小时。

确保在安静和阴暗的环境下苏醒。

注意给麻醉的动物保温，防止热量失去过多。

[与其它药物的相互作用]

不要与以下药物同时使用：

吩噻嗪(乙酰丙嗪、氯丙嗪)，因为可能会出现心脏和呼吸功能降低和体温降低的风险。

氯霉素，因为降低麻醉药的代谢率。

[保存]

Zoletil舒泰在冻干状态至少可以保存2年，稀释后，在4℃暗处，可以保存8天。

[包装说明]

Zoletil舒泰20：每盒2瓶(冻于瓶十稀释液瓶)

Zoletil舒泰50：每盒2瓶(冻干瓶十稀释液瓶)

Zoletil舒泰100：每盒2瓶(冻干瓶十稀释液瓶)

生产与代理企业

生产商：法国维克宠物保健公司Virbac